

PACIENTE AMBULATORIO 2023 GAMAGRAFIA CON META IODO BENCILGUANIDINA [MIBG]

- El paciente debe traer documentación original (orden médica y autorización emitida por el asegurador).
- El paciente debe presentarse al servicio 30 minutos antes de cita.
- El paciente debe asistir con un acompañante si lo requiere (Adulto mayor, condición clínica del paciente).
- Evite traer joyas, prendas y objetos de valor.
- Se recomienda traer ropa y zapatos cómodos.
- No olvide traer resumen de historia clínica y estudios anteriores si los tiene.
- Requiere ayuno de 4 horas.
- En menores de edad, el médico pediatra tratante realizará formulación necesaria para bloquear la glándula tiroides con administración diaria de lugol. Dosis 1-2 mg/kg día. En adultos (formulación por médico nuclear), equivalente a 3 gotas cada 8 horas. Iniciar desde 1 día antes de la administración del radiofármaco y terminar 3 días después, esta preparación es magistral verifique entrega de medicamento con nombre del paciente, cantidad. Este se puede disolver en agua. Si no puede obtener esta preparación, avise de inmediato para verificar realización de examen.
- Tenga en cuenta suspender los siguientes medicamentos: suspender drogas que alteren la captación del medicamento MIBG, durante 2 semanas antes del estudio suspender farmacos como opioides, cocaína, heroína, y tramadol. También *Suspender por 6 semanas antes: antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y derivados, imipramina y derivados, amoxapina, loxapina, doxapina.