

PREPARACION GENERAL PACIENTE AMBULATORIO 2023 PERFUSION MIOCARDICA EN REPOSO Y POST

- El paciente debe traer documentación original (orden médica y autorización emitida por el asegurador)
- El paciente debe presentarse al servicio 30 minutos antes de cita.
- El paciente debe asistir con un acompañante si lo requiere (Adulto mayor, condición clínica del paciente)
- Evite traer joyas, prendas y objetos de valor.
- Se recomienda traer ropa y zapatos cómodos.
- No olvide traer resumen de historia clínica y estudios anteriores si los tiene.
- Dos días antes del examen suspender bebidas oscuras (tinto, te, chocolate, Coca-Cola)
- Tres días antes del examen suspender medicamento metoprolol, propranolol, carvedilol y bisoprolol.
- El día anterior al examen suspender medicamentos como teofilina, aminofilina.
- Disponibilidad de tiempo (4 horas).
- Traer 3 botellas de agua con gas en pacientes ambulatorios. Tomarlas sólo luego de la inyección.
- Dieta NORMAL luego del estudio
- Si está embarazada o piensa que podría estarlo infórmelo al tecnólogo o médico del servicio.
- Si por condición clínica el paciente requiere el uso de pañal, debe traer dos adicionales junto con paños húmedos y crema si lo requiere.
- Si el estudio es bajo sedación o anestesia debe tener un ayuno de 12 horas.

Indicaciones previas

- Si está amamantando, guarde la última recolección de leche en condiciones de refrigeración para que sea administrada posteriormente a la inyección del trazador.
- No podrá amamantar por un periodo determinado que le será explicado en el servicio el día de su examen.

Indicaciones posteriores

- Deberá evacuar frecuentemente y aumentar la ingesta de líquido (excepto cuando exista restricción a la ingesta de líquidos por parte del médico tratante).
- Bajar la cisterna dos veces al utilizar el baño.
- Evitar estar cerca de mujeres embarazadas o niños pequeños durante 24 horas posteriores al examen