PACIENTE CON COLOSTOMIA - PM

Dieta liquida desde la confirmación de la cita

| HORA | PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR AL PROCI | EDIMIENTO |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3:00 P.M. del día anterior al procedimiento | 10 mg de Bisacodilo vía oral | Tomar 1 vaso de la preparación cada 10 minutos hasta terminar |
| 7:00 P.M. del día anterior al procedimiento | 1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua | |
| 9:00 P.M. del día anterior al procedimiento | 1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua | |
| 6:00 P.M. del día del procedimiento | l sobre de polietinglicol mas electrolitos en l litro de agua | |
| 8:00 P.M. del día del procedimiento | 1 sobre de polietinglicol mas electrolitos en 1 litro de agua | |
| | 1 | |

1 ENEMA Por el ano a las 2:00pm, 8:00pm y 4:00am Los tres enemas deben ser colocados el día anterior del procedimiento

PACIENTE CON ILEOSTOMIA - PM

Dieta liquida desde la confirmación de la cita (Recuerda que estos pacientes no requieren preparación oral si se trata de una ileostomia)

| | HORA PREPARACION CON ENEMA - RECTAL | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|
| 2 | 2:00 P.M. | 1 ENEMA Por el ano | |
| 4 | 4:00 P.M. | 1 ENEMA Por el ano | |
| [| B:00 P.M. | 1 ENEMA Por el ano | |



Colonoscopia Ambulatorio

Unidad de Clínicas Endoscópicas Servicio de Coloproctología

Dr. Carlos Figueroa Avendaño Dra. María Angélica Cendales Dr. Juan Guillermo Cala

Código de Almera: FO-CQX-19

Colonoscopia Ambulatorio

Nombre del paciente: CC: Fecha: Hora:

Ubicación: Clínicas endoscópicas (Sótano)

RECOMENDACIONES

| % | Ayuno de 4 horas |
|----------|------------------|
| ~ | , , , |

- El paciente debe ingresar SIN PRÓTESIS DENTAL, JOYAS, NI ESMALTE EN LAS UÑAS
- Asistir con acompañante de forma obligatoria.
- La preparación es a base de Polietilenglicol 3350 más electrolitos, comercialmente se consiguen como Travad ColonPEG o Nulytely, puedes escoger cualquiera.

| OBSERVACIONES | SI | NO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Reportar alergias a medicamentos y/o insumo medico | | |
| Toma medicamentos para la anticoagulación (ASPIRINA, ASPIRINETA ,CLOPIDOGREL, RIVAROXABAN, DAVIGATRAN) | | |
| Tiene un diagnóstico de enfermedad hepática/del hígado | | |
| Tiene un diagnóstico de base de enfermedad sanguínea/hematológica | | |
| Tiene diagnóstico de insufiencia renal | | |
| Le realizan diálisis peritoneal o Hemodiálisis | | |
| Tiene válvulas cardíacas, marcapasos, cardiodesfibrilador | | |

Si le van a realizar una colonoscopia terapéutica (polipectomia, mucosectomia), dilatación, ligadura de hemorroides, argón plasma, control de hemorragia) y consume alguno de los medicamentos y cumple alguna de las observaciones anteriores Deberá asistir 5 días antes de la cita El día: Horario: 8:00 -12:00

RECUERDE:

traer reporte de laboratorios, radiografías y colonoscopias previas.

Dieta que debe hacer durante los 3 días previos a la Colonoscopia:

Puede tomar y comer: arroz, pastas, caldo de carne o pollo, carnes y pescados, a la plancha o hervidos, huevo, tinto, limonada, jugo de lulo bien colado, jugo de piña o manzana no natural, bebidas de hidratación.



No puede comer: : frutas, fibra natural (avena, linaza), verduras, legumbres, hortalizas, guisos, embutidos (salchichas, chorizos), pan, productos de pastelería, leche y sus derivados, (yogurt, queso, natilla, flan), alcohol y gaseosas.



Dieta que debe hacer el día antes del procedimiento:

- 1. La cena debe ser únicamente consomé (sin verdura, papa, carne o pollo), agua aromática, té, agua, gelatina de cualquier color excepto roja, y puede continuar esta dieta hasta 4 horas antes del procedimiento.
- 2. Debe tomar hidróxido de magnesio (leche de magnesia) 10cc (2 cucharadas soperas) cada 12 horas, el día antes de iniciar la preparación (No Aplica Para Quienes Tengan Ileostomia).

Preparación de pacientes para paciente ambulatoria citados a procedimiento en la tarde

La preparación se deberá iniciar el día anterior a la cita.

PREPARACIÓN - NORMAL- PM

Dieta liquida desde la confirmación de la cita

| HORA | | PREPARACIÓN DEL DÍA ANTERIOR AL PROCEDIMIENTO | | |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 3:00 P.M. del día d al procedimiento | interior 10 | mg de Bisacodilo vía oral | Tomar 1 vaso de la preparación cada 10 | |
| 7:00 P.M. del día a al procedimiento | | obre de polietinglicol mas ectrolitos en 1 litro de agua | | |
| 9:00 P.M. del día da al procedimiento | | sobre de polietinglicol mas ectrolitos en 1 litro de agua | | |
| 6:00 A.M. del día o procedimiento | | cobre de polietinglicol mas ectrolitos en 1 litro de agua | minutos hasta terminar | |
| 8:00 A.M. del día o procedimiento | | sobre de polietinglicol mas ectrolitos en 1 litro de agua | | |